



Gelsectan®

Prikkelbare Darm | Colon Irritable | Reizdarm

(NL)

Gebruiksaanwijzing

Indicaties

Gelsectan® is bedoeld om de darmfunctie te herstellen bij mensen die last hebben van symptomen als gevolg van het prikkelbare darm syndroom (PDS), die verband kunnen houden met intestinale overgevoeligheid of na het innemen van sommige geneesmiddelen om symptomen, zoals diarree, gespannen buik, pijn, opgeblazen gevoel en winderigheid te verlichten of te voorkomen.

Presentaties

Blisterverpakking met dertig of zestig capsules voor gebruik door volwassenen.

Samenstelling

Xyloglucan, erwtenewit en extract van druivenpitten, xylo-oligosacchariden, magnesiumstearaat (van plantaardige oorsprong) en amorfe geprecipiteerde silica.

Aanwijzingen voor gebruik

De capsules innemen met vloeistof.

Dosering

1 of 2 capsules, afhankelijk van de symptomen, tweemaal per dag ('s morgens en 's avonds voor het eten) gedurende 2 tot 4 weken. De behandeling kan, indien nodig, worden voortgezet.

Opgelet

- Raadpleeg een arts die het prikkelbare darm syndroom (PDS) bij u kan vaststellen.
- Raadpleeg een arts bij ernstige of aanhoudende symptomen of bij twijfels over de diagnose, vooral bij ouderen.
- Dit medisch hulpmiddel is geen farmacologische behandeling. Indien een dergelijke behandeling is aanbevolen door een professionele zorgverlener, kan het hulpmiddel gelijktijdig worden gebruikt. Overleg dit altijd met uw arts.
- Er zijn geen bijwerkingen bekend, mits het product gebruikt wordt volgens de gebruiksaanwijzing. Wij adviseren om het product niet te gebruiken tijdens de zwangerschap of de eerste maanden van de borstvoeding, tenzij anders aangegeven door een professionele zorgverlener.
- Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op de verpakking.
- Het product niet gebruiken als de blister geopend of beschadigd is.
- Niet bewaren boven 25°C. Niet invriezen.
- Het product buiten het bereik van kinderen houden.

Contra-indicaties

Gelsectan® mag niet worden gebruikt bij mensen met een bekende overgevoeligheid voor xyloglucan of enig ander ingredient uit de lijst vermeld in de rubriek "Samenstelling".

Medisch hulpmiddel

(FR)

Instructions d'utilisation

Indications

Gelsectan® est conu pour restaurer la fonction intestinale chez les personnes presentant des symptomes dus au syndrome du colon irritable (SCI), qui peuvent tre li  une hypersensibilit intestinale ou  la prise de certains mdicaments pour soulager et prvenir des symptomes tels que la diarrhe, la tension abdominale, la douleur, les ballonnements et les flatulences.

Prsentations

Plaquette thermoforme contenant trente ou soixante glules pour une utilisation chez l'adulte.

Composition

Xyloglucan, protine du pois et extrait de ppin de raisin, xylo-oligosaccharides, starate de magnsium (origine vgtale) et silice prcipite amorphe.

Mode d'emploi

Avaler les glules avec des liquides.

Posologie

1 ou 2 glules en fonction des symptomes, deux fois par jour (le matin avant le petit-djeuner et le soir avant le dner) pendant 2  4 semaines. Le traitement peut tre maintenu au besoin.

Avertissements

- Consultez un mdecin qui peut tablir que vous avez un syndrome du colon irritable (SCI).
- Consultez un mdecin en cas de symptomes svres ou persistants, ou lorsqu'il existe des doutes quant au diagnostic, en particulier chez les personnes ges.
- Ce dispositif mdical n'est pas un traitement pharmacologique. Si un professionnel de la sant recommande un tel traitement, le dispositif peut tre administr simultanment. Consultez toujours votre mdecin.
- Aucun effet indsirable connu n'est associ au produit lorsque celui-ci est utilis conformment aux instructions d'utilisation mode d'emploi. Il est recommand de ne pas utiliser ce produit pendant la grossesse ou les premiers mois de l'allaitement, sauf si d'autres conseils ont t donns par un professionnel de la sant.
- Ne pas utiliser ce produit aprs la date de premption imprime sur l'emballage.
- Ne pas utiliser le produit si la plaquette est ouverte ou endommage.
-  conserver  une temprature ne dpassant pas 25°C. Ne pas congler.
- Tenir le produit hors de la porte des enfants.



Gelsectan®

Prikkelbare Darm | Cölon Irritable | Reizdarm

Contre-indications

Gelsectan® ne doit pas être utilisé chez des patients présentant une hypersensibilité connue au xyloglucan ou à l'un des autres composants du produit (voir Composition).

Dispositif médical



Gebrauchsanweisung

Behandlungsanzeige

Gelsectan® ist für die Anwendung zur Wiederherstellung der Darmfunktion bei Personen mit Symptomen aufgrund von Reizdarmsyndrom (RDS), die durch Überempfindlichkeit des Darms oder nach der Einnahme bestimmter Medikamente verursacht werden können, um Symptome wie Durchfall, abdominales Spannungsgefühl, Schmerzen, Blähbauch und Flatulenz zu lindern und zu vermeiden.

Packungsgrößen

Blisterpackung mit dreißig oder sechzig Kapseln zur Anwendung bei Erwachsenen.

Zusammensetzung

Xyloglucan, Erbsenprotein und Traubenkernextrakt, Xylo-oligosaccharide, Magnesiumstearat (pflanzlich) und amorphes gefälltes Siliciumdioxid.

Hinweise zur Anwendung

Kapsel mit Flüssigkeit schlucken.

Dosierung

Abhängig von den Symptomen 1 oder 2 Kapseln zweimal täglich (morgens vor dem Frühstück und abends vor dem Abendessen) über einen Zeitraum von 2 bis 4 Wochen. Die Behandlung kann falls nötig aufrechterhalten werden.

Warnhinweise

- Die Diagnose Reizdarmsyndrom (RDS) kann ausschließlich von Ihrem Arzt gestellt werden.
- Wenden Sie sich bei schweren oder anhaltenden Symptomen oder bei Unsicherheiten bezüglich der Diagnose an einen Arzt, insbesondere bei älteren Menschen.
- Bei diesem Medizinprodukt handelt es sich nicht um eine pharmakologische Behandlung. Falls eine solche Behandlung von einem Arzt empfohlen wird, kann das Medizinprodukt begleitend verabreicht werden. Besprechen Sie dies in jedem Fall mit Ihrem Arzt.
- Falls das Produkt laut Gebrauchsanweisung verwendet wird, sind Nebenwirkungen nicht bekannt. Wir empfehlen, falls nicht anders vom Arzt verordnet, das Produkt nicht während der Schwangerschaft oder in den ersten Monaten der Stillzeit anzuwenden.
- Produkt nicht nach Ablauf des Verfalldatums anwenden, das auf der Packung abgedruckt ist.

- Produkt nicht anwenden, wenn die Blisterpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- Nicht über 25 °C lagern. Nicht einfrieren.
- Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Gegenanzeigen

Gelsectan® soll nicht bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Xyloglucan oder einen der im Abschnitt „Zusammensetzung“ genannten sonstigen Bestandteile des Produkts angewendet werden.

Medizinprodukt



DEVINTEC SAGL
Corso Elvezia, 14
6900 Lugano – Zwitterland/Suisse/Schweiz

BE: Verdelers/Distributeur/Vertrieb
Truvion Healthcare N.V. | Walgoedstraat 12A
9140 Temse | België/Belgique/Belgien
www.gelsectan.be



1370

NL: Distributeur
Truvion Healthcare B.V. | Postbus 145, 1380 AC
Weesp | Pampuslaan 186, 1382 JS Weesp
Nederland
www.gelsectan.nl



Devintec Health S.L.
Calle Jimenez, 10
24767 Herrerros de Jamuz Leon
Spanje/Espagne/Spainen

Rev. 03c0224:09.06.2021